

استیل سیستین ۶۰۰ قرص جوشان

این برگه راهنمای دارو را قبل از مصرف مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی اطلاعات جدیدی باشد. این اطلاعات جایگزین مشورت شما با پزشک معالجتان در مورد وضعیت پزشکی یا درمان شما نمی شود. در صورتی که هرگونه سوالی در مورد استیل سیستین دارید از پزشک یا داروساز خود سوال کنید.

راهنمای عمومی بیمار:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.
- قبل از مصرف این دارو در مورد داروهایی که در حال مصرف آنها می باشید (اعم از داروهای نسخه ای یا بدون نسخه) یا داشتن هرگونه حساسیت یا واکنش حساسیتی به این دارو یا هر داروی دیگر، غذاها، رنگ های خوراکی و مواد نگهدارنده به پزشک خود اطلاع دهید.

- این دارو تنها در صورت تجویز پزشک قابل مصرف است.
- در صورتیکه با مصرف دارو شرایط بهبود پیدا نکرد و یا بدتر شد به پزشک خود اطلاع دهید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- **دوران بارداری:** درمورد مصرف استیل سیستین در دوران بارداری با پزشک خود مشورت کنید.
- **دوران شیردهی:** ترشح استیل سیستین در شیر مشخص نیست. این دارو را دوران شیردهی مصرف نکنید مگر در صورت تجویز پزشک.

هشدارها:

- در صورتی که تغییری در پوست خود مشاهده کردید فوراً به پزشک خود اطلاع دهید
- مصرف استیل سیستین را قطع کنید.
- هنگامی که قوطی دارو را باز میکنید ممکن است بوی خفیف سولفور احساس کنید. این بو طبیعی است و ویژگی دارو می باشد و پس از مصرف دارو به سرعت برطرف میشود.

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان داروهای زیر همزمان با مصرف استیل سیستین توصیه نمی شود. در صورت مصرف هر یک از این داروها به پزشک خود اطلاع دهید:

- گاباپامپین، نیتروگلیسرین
- سرکوب کننده های سرفه: سرکوب کننده های سرفه نباید همزمان با استیل سیستین مصرف گردد، باید هنگام مصرف استیل سیستین توانایی سرفه کردن داشته باشید تا با سرفه خلط های شل یا رقیق شده خارج گردد.
- آنتی بیوتیک ها: توصیه میگردد مصرف آنتی بیوتیک ها حداقل دو ساعت با مصرف استیل سیستین فاصله داشته باشد.

سایر موارد پزشکی:

در صورت ابتلا به هر یک از موارد پزشکی، بخصوص مورد ذیل حتماً پزشک خود را در جریان بگذارید:
آسم (ممکن است استیل سیستین شرایط بیماری را بدتر کند). کاهش توانایی در سرفه کردن (خلط ها باید بوسیله ی مکش خارج شوند)، سابقه زخم معده.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو برای بیماران مختلف متفاوت است و این مقدار را پزشک تعیین میکند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

- برای کاهش غلظت خلط:
- بزرگسالان: ۶۰۰ میلی گرم یکبار در روز
- یک قرص جوشان (۶۰۰ میلیگرم) را در یک لیوان آب حل کرده و میل کنید.
- نوبت مصرف فراموش شده: در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض بیدار آوردن، فوراً آن را میل نمایید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض جانبی ذیل و هر عارضه دیگری که در این برگه راهنما ذکر نشده باشد با پزشک یا داروساز تماس بگیرید:

اسهال، تب، ناراحتی گوارشی، سردرد، کاهش فشار خون، تهوع، اسهراغ، استوماتیت (التهاب فراگیر دهان شامل مخاط دهان، لب ها، زبان، کام)، وزوز گوش، خونریزی، ادم (ورم صورت).

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، به دور از حرارت، رطوبت و نور مستقیم، در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
- از نگهداری داروی تاریخ گذشته یا داروی مازاد بر نیاز و باقیمانده خودداری کنید.

شکل ظاهری و نحوه ارائه دارو:

قرص جوشان استیل سیستین در بسته بندی های ذیل توسط شرکت داروسازی کارن به بازار عرضه می گردد:

- قرص های جوشان گرد حاوی ۶۰۰ میلی گرم استیل سیستین در جعبه های حاوی یک قوطی ۱۰ عددی همراه با برگه راهنمای دارو.
- تاریخ آخرین تدوین و بازبینی برگه راهنما:**
- اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

دارنده پروانه ساخت و تولیدکننده:

شرکت داروسازی کارن - یزد - ایران
محل ساخت: شرکت داروسازی کارن - یزد - ایران
آدرس: ایران - یزد - شهرک صنعتی خضر آباد - بلوار ابریشم - بلوار اقا قیا - ۲۴ متری زیتون - شرکت داروسازی کارن

پست الکترونیک: info@karenpharma.com

سایت اینترنتی: www.karenpharma.com

Karen
داروسازی کارن
A Legacy of Excellence

شرکت داروسازی و مکمل های غذایی - حیاتی کارن

ACETYL CYSTEINE 600

Effervescent Tablet

Read this leaflet carefully before you start taking Acetylcysteine. There may be new information. This information does not take the place of talking with your doctor about your medical condition and treatment. If you have any questions, ask your doctor or pharmacist.

General guidance:

- This medicine has been prescribed for your present disease. Do not pass it on to others with same symptoms.
- Tell your doctor before taking this medicine if you are taking any other prescription or non-prescription (over-the-counter) medicine or if you have had any unusual or allergic reaction to this medicine or any other medicines, foods, dyes, preservatives.
- This medicine is available only with your doctor's prescription.
- If your condition does not improve or if it becomes worse, check with your doctor.

Pregnancy and breastfeeding:

Pregnancy: Consult your doctor about using Acetylcysteine during pregnancy.

Breastfeeding: It is not known whether Acetylcysteine is excreted in breast milk, do not use this medicine during breastfeeding unless your doctor orders you to do so.

Precautions:

- If new changes to the skin or mucus membranes occur, you must immediately consult a doctor and stop using Acetylcysteine.
- When opening the package, you may notice that the medicine has an unpleasant odor at first. This is a property of the active ingredient and is normal, the smell will go away soon after you use the medicine.

Drug interactions:

It is important that your healthcare professional know if you are taking any medicines especially the following:

- Carbamazepine, Nitroglycerin
- Cough suppressants: Cough suppressants should not be used at the same time, as you must be able to cough up the loosened or thinned mucus.
- Antibiotics: You are advised to take antibiotics two hours before or after Acetylcysteine.

Other medical problems:

Make sure you tell your doctor if you have any other medical problems especially: asthma (Acetylcysteine may make the condition worse),

decreased ability to cough (the mucus may have to be removed by suctioning), history of peptic ulceration.

How to take Acetylcysteine:

The dose of this medicine will be different for different patients, and the doctor must always tell you how to use the medicine, but the usual dose is:

- For reduction of mucus viscosity:
Adult: 600 mg once daily
* Dissolve one effervescent tablet (600 mg) in a glass of water.
- * Missed dose: If you miss a dose of this medicine, take it as soon as possible. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not double doses.

Side effects:

Every medicine by the side of therapeutic effects may cause some adverse effects, although not everybody gets them. If you notice the following side effects or any other side effects not listed in this leaflet talk to your doctor or pharmacist:
diarrhea, fever, gastrointestinal discomfort, headache, hypotension, nausea, vomiting, stomatitis, tinnitus, hemorrhage, face edema.

Storage:

- Store the medicine below 30°C, away from heat, moisture and direct light, in the original packaging.
- Keep out of the reach of children.
- Do not keep outdated medicine or medicine no longer needed.

Packaging:

Acetylcysteine effervescent tablets manufactured by Karen pharmaceutical company are available as:

- Round effervescent tablets containing 600 mg Acetylcysteine in a cardboard box containing a tube of 10 effervescent tablets with a leaflet.

Revision date: May 2025

Manufacturer: Karen pharmaceutical company

Manufacturing site: Karen pharmaceutical company, Yazd, Iran

Address: Karen pharmaceutical company, 24 meters of Zeyton, Aghaghia Boulevard, Abrisham Boulevard, Khezrabad Industrial town, Yazd, Iran

Email: info@karenpharma.com

Website: www.karenpharma.com

Karen
PHARMACEUTICAL CO. کاروسازی کارن
A Legacy of Excellence
Karen Pharma Co. Iran-yazd