

رزوواستاتین

قرص روکشدار

رزوواستاتین بصورت قرص خوراکی حاوی رزوواستاتین در دوزهای ۵ میلی گرم، ۱۰ میلی گرم، ۲۰ میلی گرم و ۴۰ میلی گرم به منظور پایین آوردن میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون مورد استفاده قرار می گیرد.

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو در مورد داروهایی که در حال مصرف آنها می باشید (اعم از داروهای با نسخه یا بدون نسخه) با پزشک خود صحبت کنید.
قبل از مصرف این دارو در صورت ابتلا به موارد ذیل با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هرگونه حساسیت، دیابت، فشار خون پایین، مشکلات کلیوی، مشکلات کبدی، بالا بودن تعداد آنزیمهای کبدی، مشکلات عضلانی، کم کاری تیروئید، وجود پروتئین در ادرار، سابقه تشنج.
- در صورت بارداری یا شیردهی به نوزاد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

گروه دارو در بارداری: X

بارداری: مصرف این دارو در بانوان باردار یا کسانی که قصد بارداری دارند ممنوع می باشد.

دوران شیردهی: توصیه می شود که مصرف این دارو در دوران شیردهی تنها با تجویز پزشک صورت بگیرد.

* هشدارها:

- در طول دوره مصرف این دارو ضروری است که پزشک شما تاثیر دارو در پایین آوردن میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون شما را بررسی نماید بنابراین بطور منظم با پزشک خود در ارتباط باشید.

- در صورت باردار شدن و یا شک به بارداری بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.

- در صورت مصرف این دارو قبل از انجام هر گونه جراحی (از قبیل جراحی دهان و دندان و هرگونه امور دندانپزشکی) جراح یا دندانپزشک خود را مطلع سازید.

- مصرف همزمان این دارو با مقادیر زیادی از نوشابه های الکلی می تواند

خطر بالا رفتن آنزیمهای کبدی را افزایش دهد.

- در صورت بروز دردها و ضعفهای عضلانی غیر قابل توجه بخصوص اگر با خستگی و تب توأم باشد با پزشک خود تماس بگیرید زیرا عوارض ناخواسته دارو می تواند منجر به آسیبهای کلیوی گردد.

- در صورت عدم حصول بهبودی در علائم یا حتی وخیم تر شدن آنها با پزشک خود تماس بگیرید.

- مطالعات در زمینه اثر بخشی دارو بر روی افراد بالغ و بیماران بالای ۸ سال صورت گرفته است و مطالعات کافی در زمینه اثرات دارو در کودکان کمتر از ۸ سال وجود ندارد.

- عوارض جانبی ناشی از مصرف دارو در افراد ۶۵ سال و بالاتر از آن در مقایسه با سایر رده های سنی یکسان گزارش شده است.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو برای افراد مختلف، متفاوت است. از دستور پزشک خود پیروی کنید یا طبق برگه راهنما عمل کنید:

افراد بالغ و بزرگسالان:

۴۰ تا ۵۰ میلی گرم یک بار در روز

• کودکان: امکان مصرف دارو و دوز مورد نیاز باید توسط پزشک مشخص گردد.

در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض بیدار آوردن فوراً آن را میل نمایید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

تداخلات دارویی: مصرف همزمان این دارو با داروهای ذیل توصیه نمی شود: سیکلوسپورین، جم فیبروزیل، نیاسین

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض جانبی زیر یا هر عارضه دیگری بلافاصله با پزشک یا داروساز تماس بگیرید:

• عوارض جانبی معمول و متداول: درد بدن، احتقان بینی، سرفه، خشکی و سوزش گلو، سردرد.

• عوارض جانبی با شیوع نامشخص: درد معده و ناحیه شکم، مدفوع تیره رنگ، بوی نامطبوع تنفس، تهوع، عصبی شدن، بثورات جلدی، زرد شدن پوست و چشم ها.

شرایط نگهداری:

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.

• دارو را از حرارت، رطوبت، نور مستقیم و یخ زدگی محافظت نمایید.

• دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

• از مصرف داروی تاریخ گذشته یا داروی مازاد بر نیاز و باقیمانده خودداری کنید.

شکل ظاهری و نحوه ارائه دارو:

قرص های خوراکی رزوواستاتین در جعبه های ۳۰ عددی به صورت ۳ پلیستر ۱۰ عددی حاوی رزوواستاتین در دوزهای ۵ میلی گرم، ۱۰ میلی گرم، ۲۰ میلی گرم و ۴۰ میلی گرم همراه با برگه راهنما توسط شرکت داروسازی کارن به بازار عرضه می گردد.

تاریخ آخرین بازبینی: شهریورماه ۱۴۰۴

محل ساخت: شرکت داروسازی کارن - یزد - ایران

آدرس: ایران - یزد - شهرک صنعتی خضر آباد - بلوار ابریشم - بلوار افاقیا - ۲۴ متری زیتون - شرکت داروسازی کارن

info@karenpharma.com

www.karenpharma.com

پست الکترونیک:

سایت اینترنتی:

Karen
داروسازی کارن
A Legacy of Excellence

شرکت داروسازی و مکمل های غذایی - حیاتی کارن

Rosuvastatin

F.C. Tablet

Rosuvastatin oral tablet in different doses containing Rosuvastatin 5mg, 10 mg, 20 mg and 40mg is used to lower cholesterol and triglyceride levels in the blood.

General guidance

This medicine has been prescribed for your present disease. Do not pass it on to others with same symptoms.

Before taking this medicine, tell your doctor if you are taking any other prescription or non-prescription (over-the-counter) medicine.

Before using this medicine tell your doctor or pharmacist if you have any other medical problems, especially: allergies, diabetes mellitus, low blood pressure, kidney disease, liver problems, high liver enzymes, muscle problems, under active thyroid, protein in the urine, convulsions, pregnancy or breastfeeding.

Pregnancy and breastfeeding:

Pregnancy category: X

Rosuvastatin should not be used in women who are or may be pregnant .

Breastfeeding: It is recommended to consult with your physician before taking this medicine during breastfeeding.

Precautions :

- It is very important that your doctor check your progress at regular visits. This will allow your doctor to see if the medicine is working properly to lower your cholesterol or triglyceride levels and to decide if you should continue to take it.
- Check with your doctor immediately if you think that you may be pregnant .
- Before having any kind of surgery (including dental surgery) or emergency treatment, tell the medical doctor or dentist in charge that you are taking this medicine.
- Do not use excessive amounts of alcohol while taking this medicine because it can worsen the adverse effects of this medicine on the liver.
- Check with your doctor immediately if you experience unexplained muscle pain, tenderness, or weakness especially if it is accompanied by unusual tiredness or

fever, because the medicine's adverse effects can lead to serious kidney problems.

- If your symptoms do not improve or if they become worse check with your doctor.
- Studies on this medicine have been done only in adult patients and patients 8 years of age and older. There is no specific information comparing use of it in children with use in other age groups.
- There is no problems in patients 65 years of age or older than it does in younger adults.

How to take Rosuvastatin

The dose of this medicine will be different for different patients. follow your doctor's orders or directions on the label.

- Adults: 5 to 40 mg once daily.
- Children: Use and dose must be determined by the doctor.

Missed dose: If you miss a dose of this medicine, take it as soon as possible. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not double doses.

Other medicines: Using this medicine with any of the following medicines is usually not recommended:

Cyclosporine, Gemfibrozil, Niacin.

Adverse effects:

Every medicine by the side of therapeutic effects may cause some adverse effects, although not everybody gets them, check with your physician if any of the following side effects occur:

More common:

Body aches or pain, congestion, cough, dryness or soreness of throat, headache.

Incidence not known:

Abdominal or stomach pain, clay-colored stools, unpleasant breath odor, nausea, nervousness, skin rashes, yellow eyes or skin.

Storage

- Store the medicine in a closed container below 30 °C .
- Protect from heat, moisture, direct light and freezing.
- Keep out of the reach of children.
- Do not keep outdated medicine or medicine no longer needed.

Packaging:

Rosuvastatin tablets manufactured by Karen pharmaceutical company are available in different doses of 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg in a cardboard box containing 3 blisters of 10's with a leaflet for each dose.

Revision date:

September 2025

Manufactured by:

Karen pharmaceutical company, Yazd, Iran

Address:

Karen pharmaceutical company, 24 meters of Zeyton, Aghaghia Boulevard, Abrisham Boulevard, Khezrabad Industrial town, Yazd, Iran

Email: info@karenpharma.com

Website: www.karenpharma.com

Karen
PHARMACEUTICAL CO. دروسازی کارن
A Legacy of Excellence...
Karen Pharma Co. Iran-yazd